

# PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

## Neocapil Dermálny roztok

### Minoxidil

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.**

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Neocapil obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

**V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:**

1. Čo je Neocapil a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Neocapil
3. Ako používať Neocapil
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Neocapil
6. Ďalšie informácie

## 1. ČO JE NEOCAPIL A NA ČO SA POUŽÍVA

Neocapil je kožný roztok, ktorý sa používa na miestnu liečbu vypadávania vlasov u dospelých mužov a žien, zvyčajne spôsobenú niektorými hormónmi (Alopecia androgenetica). Neocapil zastavuje ďalšie vypadávanie vlasov a podporuje rast vlasov v prerednutých až lysých oblastiach hlavy.

## 2. SKÔR AKO POUŽIJETE NEOCAPIL

### Nepoužívajte Neocapil

- ak ste alergický/á (precitlivený/á) na minoxidil alebo na propylénglykol
- ak máte menej ako 18 rokov alebo viac ako 65 rokov, keďže používanie lieku v uvedenom veku ešte nie je dostatočne overené

### Používanie iných liekov

Zatiaľ nie je známe, že by sa účinky lieku Neocapil a účinky iných súčasne užívaných liekov ovplyvňovali. Napriek tomu, v prípade, že užívate lieky na zníženie krvného tlaku, je nutné dbať na jeho častejšiu kontrolu.

### Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Nepoužívajte Neocapil, ak ste tehotná (alebo by ste mohli byť), alebo ak dojčíte.

### Vedenie vozidla a obsluha strojov

Tento liek by nemal ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

## 3. AKO POUŽÍVAŤ NEOCAPIL

Vždy používajte Neocapil presne tak, ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnik.

### **Návod na správne použitie**

Snímte plastový vrchnák z fľašky a roztok Neocapil nastriekajte na úplne suchú pokožku prerednutých až úplne lysých oblastí vlasatej časti hlavy 2-krát denne do mierneho zvlhčenia. Dajte pozor, aby roztok nestekal. Na jedno ošetrenie použite maximálne 10 dávok, čo zodpovedá 1 ml roztoku.

V prípade prerednutia vlasov v rozsahu celej hlavy u žien (tzv. difúzna alopecia) použite na presnejšie dávkovanie prídavný násadec s predĺženou špičkou. Násadec po zložení plastového vrchnáka a sprejovej hlavičky z fľašky umiestnite na vystupujúci ventil a ošetríte postihnuté miesta podľa pokynov uvedených vyššie.

Po ošetrení si starostlivo umyte ruky a aj náhodne zasiahnuté iné oblasti kože chladnou tečúcou vodou. Pri náhodnom kontakte s citlivými miestami (oči, poranená koža, sliznica) ich dôkladne opláchnite dostatočným množstvom čistej vody. Ošetrovanú kožu ani vlasy nesušte fénom.

### **Trvanie liečby**

Liečba je dlhodobá (minimálne 3 mesiace) a jej dĺžku určuje lekár. Nástup účinku liečby a rozsah obnovy rastu vlasov sú individuálne.

### **Nepoužívajte**

- viac ako 1 ml roztoku (10 dávok) na jedno ošetrenie bez ohľadu na veľkosť ošetrovanej plochy
- viac ako 2 ml roztoku (20 dávok) denne

### **Ak použijete viac lieku Neocapil, ako máte**

Pri predávkovaní, alebo ak náhodne požijete liek dieťa, sa poraďte s lekárom.

### **Ak zabudnete použiť Neocapil**

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnik.

## **4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY**

Tak ako všetky lieky, aj Neocapil môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavujú u každého.

Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich symptómov, ihneď vyhľadajte lekára – možno budete potrebovať urgentné lekárske ošetrenie.

- Opuch tváre, pier alebo hrdla, ktorý spôsobuje problémy pri prehĺtaní alebo dýchaní. Mohol by to byť príznak závažnej alergickej reakcie (neznáma frekvencia, nemožno ju odhadnúť z dostupných údajov).

Pri používaní lieku Neocapil sa môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:

### **Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 osôb)**

- kontaktný zápal kože vo vlasatej časti hlavy
- podráždenie kože v mieste použitia
- suchá koža
- olupovanie kože
- sčervenanie kože (erytém)
- svrbenie
- ekzematózne prejavy
- tvorba šupín

### **Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)**

- nadmerné ochlpenie (hypertrichóza)

### **Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 osôb)**

- prerednutie až vypadávanie vlasov (alopécia)
- rozsiahle sčervenanie kože (generalizovaný erytém)

- alergické reakcie (ako sú žihľavka alebo opuchy tváre)
- bolesť hlavy
- zápal nervov
- poruchy zraku (zníženie ostrosti videnia)
- podráždenie očí
- závrat
- bolesti za hrudnou kosťou (stenokardie)
- pokles krvného tlaku
- zrýchlenie tepu
- krátkodobé bezvedomie spôsobené nedokrvením mozgu (synkopa)
- opuchy
- zmeny chuťových vnemov
- zápal pečene
- bolesť a stuhnutosť svalov (polymyalgia)
- obličkové kamene
- sexuálne poruchy

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

## 5. AKO UCHOVÁVAŤ NEOCAPIL

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.  
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte Neocapil po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

## 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

### Čo Neocapil obsahuje

- **Liečivo** je minoxidil.  
1 ml roztoku obsahuje 20 mg minoxidilu (2 %).
- **Ďalšie zložky** sú etanol 96 %, propylénglykol a čistená voda.

### Ako vyzerá Neocapil a obsah balenia

Neocapil je číry, bezfarebný, slabo žltý až mierne ružový roztok .  
Roztok je plnený do fľaš z tmavého skla, ktoré sú ukončené sprejovou hlavičkou s ochranným plastovým vrchnákom. Fľaše sú balené v papierových škatuliach. Balenie obsahuje prídavný násadec s predĺženou špičkou.

Veľkosť balenia: 50 ml

### Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Bratislava, Slovenská republika

### Výrobca

Laboratoires Galderma- Alby sur Cheran

ZI Montdésir, Alby sur Cheran  
74540  
France

**Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo novembri 2016.**